

Ueber tuberkulöse Basilarmeningitis.

Statistische Studie am Material des pathologisch-anatomischen
Institutes in München vom Jahre 1886—1905 incl.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfasst und einer

Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Hermann Ilzhöfer,

approb. Arzt aus Augsburg.

München, 1906.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ueber tuberkulöse Basilar meningitis.

Statistische Studie am Material des pathologisch-anatomischen
Institutes in München vom Jahre 1886—1905 incl.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfasst und einer

Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

Hermann Ilzhöfer,

approb. Arzt aus Augsburg.

München, 1906.

Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.





Digitized by the Internet Archive
in 2026

Es ist noch nicht allzu geraume Zeit her, seit das eigentliche Wesen der tuberkulösen Basilarmeningitis in der richtigen und mit der Ansicht aller Autoren übereinstimmenden Weise erkannt ist.

Noch bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein finden wir keinen einheitlichen Namen für die Krankheit, indem sie bald als Phrenitis, bald als Encephalitis oder später als eine Form der Eklampsie bezeichnet wurde. Erst Robert Whytt (1768 „Observations on the dropsy of the brain“) bahnte an der Hand der Leiche den richtigen Weg zum Verständnis derselben, indem er aufmerksam machte auf das konstante Vorkommen von akutem Hydrocephalus in Verbindung mit Knötchen an der Hirnbasis.

Wenn nun damit auch schon ein grosser Schritt vorwärts geschah in der pathologisch-anatomischen Kennzeichnung der Entzündung als tuberkulöse Meningitis, so bedurfte es doch noch heftigen Kampfes, manche Verfechter gegenteiliger Ansichten von dem wirklichen tuberkulösen Ursprung jener Knötchen zu überzeugen. So suchte Empis noch im Jahre 1865 die Lehre zu verteidigen, dass es sich um eine spezifische, durch Bildung von Granulis charakterisierte Entzündung handle („Forme cérébrale de la granulie“).

Mit der epochemachenden Entdeckung und Färbung des tuberkulösen Infektionserregers durch Robert Koch fanden alle anderen Ansichten ihre volle Widerlegung und die Krankheit als tuberkulöse Form der Entzündung war voll und klar erkannt. Sie erhielt nun auch dementsprechend einen einheitlichen, allen geläufigen Namen als „tuberkulöse Meningitis“ oder, da die Ausbreitung der Tuberkeleruption im Gehirn sich vorwiegend auf die Hirnhäute an der Basis Cerebri erstreckt, als „tuberkulöse Basilarmeningitis“.

Im Auftrag des Herrn Professors Dr. Hermann Dürck stellte ich an den in 20 Jahren (1886—1905 inkl.) im Münchener pathologisch-anatomischen Institut zur Sektion gekommenen Fällen von tuberkulöser Entzündung der Hirnhäute statistische Erhebungen an, über deren Resultat ich in folgendem berichte.

Was zunächst die im angegebenen Zeitraum beobachteten Fälle von tuberkulöser Basilar meningitis hinsichtlich der Zahl betrifft, so habe ich diese im Verhältnis zur Gesamtzahl der Sektionen in der ersten Tabelle zusammengestellt.

Tabelle I.

Jahr	Zahl der Sektionen	Tuberkulöse Basilar meningitis
1886	623	14
1887	690	16
1888	723	13
1889	801	21
1890	765	15
1891	789	19
1892	770	16
1893	797	13
1894	733	18
1895	969	24
1896	1068	11
1897	1162	14
1898	1134	9
1899	1201	20
1900	1096	19
1901	1171	20
1902	987	18
1903	1907	23
1904	1140	25
1905	1082	24
Summa	18508	342

Wir sehen aus dieser Zusammenstellung, dass von 1000 Individuen 18,4 an tuberkulöser Basilar meningitis starben, also 1,84%. In älteren Statistiken finden sich teils etwas höhere, teils niedrigere Zahlen; so gibt Harlander¹⁾ in seiner Statistik 2,3%, Seitz²⁾ 1,5% an.

Es waren ferner unter den 342 Individuen, die an tuberkulöser Basilar meningitis zu Grunde gegangen waren, 223 männlichen und 119 weiblichen Geschlechts; doch verringert sich dieser Unterschied, wenn man bedenkt, dass ca. ein Drittel mehr Männer wie Frauen zur Sektion gelangen = 3:2.

Wichtiger wie die Verteilung des Geschlechts auf die einzelnen Fälle ist die des Alters. Da in älteren Statistiken meist eine Einteilung in Kinder (0—15 Jahre) und Erwachsene (von 15 Jahren an) vorgenommen wurde, habe ich in dieser Statistik eine genauere Einteilung in einzelne Jahrzehnte durchgeführt.

Es hatten ein Alter von:


Tabelle II.

0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
114 = 33 %	39 = 11 %	97 = 28 %	49 = 14 %	30 = 9 %	8 = 2 %	5 = 1 %

In einer Kurve ausgedrückt, stellt sich dies Ergebnis in folgender Weise dar:

¹⁾ Harlander, Dissertation, München 1895.

²⁾ Seitz, Die Meningitis tuberculosa der Erwachsenen 1874.



Wir sehen also zunächst, was schon lange bekannt ist, dass das Kindesalter viel mehr der Gefahr ausgesetzt ist, an tuberkulöser Leptomeningitis zu erkranken wie das spätere Alter, ferner dass der grösste Prozentsatz an Mortalität auf die ersten zehn Jahre des Lebens trifft. Im zweiten Jahrzehnt ist die Sterblichkeit auffallend gering und sogar niedriger wie zwischen dem 30. und 40. Jahr, während andererseits die Altersstufe von 20 bis 30 Jahren ein mehr als doppelt so grosses Kontingent zu den Fällen stellt, wie das ihr vorausgehende Jahrzehnt. Vom 40. Jahr ab wird die Meningitis tuberculosa immer seltener; immerhin tritt sie auch noch nach dem 60. Lebensjahr auf. Unter den fünf dahin gehörigen Fällen von den 342 von mir zusammen-

gestellten befand sich je ein 61-, 63-, 64-, 66- und 70jähriges Individuum.

Ähnliche Resultate betreffs der Häufigkeit der tuberkulösen Basalmeningitis in den einzelnen Lebensaltern finden wir in älteren Statistiken. Harlander¹⁾ fand, dass unter 250 Fällen 85 auf das Kindesalter (0—15 Jahre) und 165 auf Erwachsene (von 15 Jahren an) trafen. Weingärtner²⁾ gibt an, dass das Kindesalter (in der eben angegebenen Begrenzung gerechnet) noch mit einem viel höheren Prozentsatz an der Erkrankung beteiligt ist, da er unter 245 Fällen 179 auf Kinder und 66 auf Erwachsene treffend fand.

Dass gerade im Kindesalter die tuberkulöse Meningitis der weichen Hirnhäute so häufig gefunden wird, ist wohl einmal darauf zurückzuführen, dass gerade in diesem Alter die akute Miliartuberkulose eine häufige Erkrankung ist; ferner aber wies Henle darauf hin, dass in den Subarachnoidealräumen, in welchen schon an und für sich eine an Nährstoffen, Eiweiss u. s. w. genügend reiche, in fortlaufender langsamer Erneuerung befindliche Flüssigkeit vorhanden ist, die einem sich entwickelnden organisierten Gifte nicht allein eine Menge bequemer Anhaftungspunkte bietet, sondern auch dessen Transport nach einer anderen Stelle in besonderer Weise begünstigt und befördert, ein noch grösserer Saftreichtum, eine noch lebhaftere Zirkulation im kindlichen Alter im Gegensatz zum erwachsenen gegeben sei.

Es findet sich in der Litteratur vielfach die Angabe, dass in gewissen Jahreszeiten die tuberkulöse Basilar-meningitis häufiger auftrete. Speziell soll die Morbidität bezw. Mortalität, da eine Heilung wohl ausgeschlossen sein

¹⁾ Harlander cf. loc. cit.

²⁾ Weingärtner, Dissertation, Kiel 1901.

dürfte, im Frühjahr eine grössere sein, während von September bis Dezember die wenigsten Fälle vorkommen sollen.

Eine daraufhin gerichtete Erhebung ergab mir folgendes:

Tabelle III.

Häufigkeit der tuberkulösen Basilar meningitis pro Monat:

Januar bis April	Mai bis August	September bis Dezember
131 = 40%	112 = 32%	100 = 28%

Es trifft also immerhin eine um wenig grössere Zahl von Fällen auf die ersten vier Monate des Jahres, doch sind die Differenzen keine erheblichen.

Ich gehe nun zur Besprechung der Ausgangspunkte der tuberkulösen Basilar meningitis über.

Nach den bisherigen Erfahrungen und Statistiken ist die Krankheit fast immer eine sekundäre, sich anschliessend an tuberkulöse Affektionen anderer Organe. Buhl (1859) stellte zuerst die Ansicht auf, dass irgendwo im Körper ein käsiger Herd vorhanden sein müsse, von dem aus die Weiterverschleppung und Resorption der infektiösen Stoffe stattfindet und diese Ansicht darf wohl auch heute noch als völlig richtig angesehen werden.

Immerhin finden sich bei der Zusammenstellung einer grösseren Anzahl von Fällen in der Regel mehrere, bei denen die tuberkulöse Entzündung der weichen Hirnhäute an der Basis scheinbar eine primäre war.

Ich fand in dieser Beziehung unter 342 Fällen 8 = 2,3%, Harlander verzeichnet unter 250 hierher gehörig 5 = 2%, Medin unter 67 Fällen 2 = 3%, Heubner unter 29 einen Fall.

Über die Art und Weise der Entstehung solcher primären Fälle wurden verschiedene Theorien aufgestellt, unter welchen, wenn man die Möglichkeit einer primären Entstehung zugeben will, die von Heller¹⁾ angegebene am meisten befriedigen dürfte. Nach derselben sind es die Lymphbahnen der Nasenschleimhaut, die nach der Entdeckung von Axel Key und Retzius mit den Lymphbahnen der Hirnhäute in offener Kommunikation stehen, auf welchen die Infektionskeime zu den Hirnhäuten, speziell an der Basis, gelangen.

Indessen weist Harlander jedenfalls in berechtigter Überlegung darauf hin, dass man auch in den scheinbar primären Fällen irgendwo im Körper einen versteckten kleinen tuberkulösen Herd annehmen dürfe, der eben bei der Sektion leicht der Beobachtung entgehen und auch bei noch so grosser Kleinheit doch genügend infektionstüchtiges Material beherbergen könne.

Es ist also, wie schon oben bemerkt, die tuberkulöse Erkrankung der Hirnhäute wohl immer sekundärer Natur, d. h. fast durchweg finden sich entweder ältere Prozesse tuberkulöser Art an einem oder mehreren Organen neben denen der Hirnhäute oder es ist die tuberkulöse Basilar-meningitis Teilerscheinung einer allgemeinen Miliartuberkulose.

Ich lasse nun zunächst eine tabellarische Übersicht über die 342 im Verlauf von 20 Jahren beobachteten Fälle folgen, in welcher ich nach den Sektionsprotokollen die jeweils gefundenen tuberkulösen Veränderungen, nach Organ-systemen geordnet, zusammengestellt habe.

¹⁾ Heller, Deutsche Vierteljahresschrift für öffentliche Gesundheitspflege, Bd. XXII, Heft I.

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdauungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
1 5 J.	Sparsame Tuberkel der Pleura, Verkäsung u. part. Erweichung d. Bronch. u. mediast. Drüsen	Allgemeine Anämie					Akute tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephal. int. Hirnöd. Dura frei. Trübung und Knötchen am meisten in d. Fossae Sylvii
2 33 J.	Tub. d. Pleura. Tub. d. l. Lunge. Peribronchitis nodosa et caseosa beider Oberlappen	Herzatrophy				Stauungs- nieren	Akute tub. Bas.-Meningitis an d. Basis bis zum Pons. Exsudation mil. Knötchen spez. in d. Fossae Sylvii
3 5 J.	Akute Mil.-Tuberk. der Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Akute tuberk. Bas.-Meningitis. Trübung zw. Pons u. Chiasma. Mil. Knötchen i. d. Fossae Sylvii
4 38 J.	Tuberk. der Lungen		Tub. Darm- geschwüre	Tub. d. Peri- toneum		Verkäsung beider Nebennieren	Tub. Bas.-Mening. Eitr. Trübung an d. Basis bis z. Kleinhirn. Mil. Knötchen i. d. Fossae Sylvii. Käs.-eitr. Solitär tuberkel i. Kleinhirn
5 26 J.	Alter käsiger Herd der linken Lunge. Kalkherde in mehreren Bronchialdrüsen. Adhäs.-Pleuritis					Stauungs- niere	Tub. Bas.-Meningitis. Sulzige Trübung an der ganzen Basis. Zahlreiche Knötchen längs der Gefäße
6 5 J.	Croupöse bronchopneumonische Herde in beiden Lungen. Zwei verkalkte Lymphdrüsen an d. linken Lungenspitze						Tub. Bas.-Meningitis. Eitrige sulz. Exsudation zw. Kleinhirnschenkel u. Chiasma
7 51 J.	Chron. Tub. beider Lungen mit Cavernabildung. Emphysem d. Lungenränder. Lungenknötchen d. zwei Unterlappen	Myodegeneratio. Atheromatose d. Aorta	Tub. Geschwüre im Ileum	Verkäsung d. retroperiton. Drüsen. Tub. d. Milz			Tub. eitr. Bas.-Meningitis mit Fortsetzung auf d. Konexität d. Stirnlappen. Gehirnod. Exsud. auf d. Haut d. Rückenmarks fortgesetzt
8 2 J.	Verkäsung d. peribronchialen Drüsen. Käsiges Herd im r. Unterlappen. Chron. Adhäsivpleuritis	Hydropericard			Tub. Eitn- lagerungen		Tub. eitr. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Sulz. Exsud. am Chiasma u. Pons u. d. Fossae Sylvii, ebenso mil. Knötchen

9 6 J.	Verkäster Herd im l. Oberlappen. Eruption frischer Mil.-Tub. Verkäste Bronchialdrüsen						Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Gehirnödem. Sulzige Exsudation am Chiasma u. Pons. Mil. Knötchen in der Fossae Sylvii
10 47 J.	Chron. Tub. u. subak. Mil.-Tub. beider Lungen. Adhäs. Pleuritis	Cor adiposum	Ausgedehnte Darmtuberkulose	Tub. d. Peritoneum. Milztumor			Ak. tub. Bas.-Meningit. Leichte Tub. in d. Gegend d. Chiasma u. d. grossen Hirnschenkel; daselbst mil. Knötchen
11 27 J.	Peribronchitis nodosa. Adhäs.-Pleuritis			Tuberk. Peritonitis			Tub. Bas.-Meningitis. Dura frei. Sulz. Exsud. am Chiasma u. Fossae Sylvii
12 36 J.	Ulcer. Tub. beider Lungen. Alte Adhäs.-Pleuritis	Hypertrophie d. r. Ventr.	Beginnende Tuberk. d. Coecum		Hypertroph. Lebercirrhose		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödem. Exsud. am Chiasma u. Fossae Sylvii
13 4 J.	Ak. allgem. Mil.-Tub. d. Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. extern. Exsud. u. Knötchen an Chiasma. <i>Neb.-Befund</i> : Prim. Tub. d. l. Femurkopfes
14 21 J.	Braune Induration der Lungen					Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Sulz. Exsud. zw. Chiasma u. Pons. Mil. Knötchen in d. Fossae Sylvii. <i>Neb.-Befund</i> : Tub. Spondylitis mit starker Kyphose
15 25 J.	Alte Spitzencirrhose r. Eitrige Cavernen l.						Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödem. Sulzige Exsud. zw. Chiasma u. Pons. Mil. Knötchen längs d. Gefässe daselbst
16 26 J.	Alte Spitz.-Tub. mit akut. käs.-eitr. Einschmelzung u. Cavernenbildung	Cor adeposum. Allgemeine Anämie					Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Starkes Ödem und Anämie d. Gehirns. Sulz. Exsud. am Chiasma, Pons u. Pedunculi, geringer in d. Fossae Sylvii; daselbst mil. Knötchen
17 7 1/2 J.	Verkäste Bronch.-Drüsen. Tuberkulose d. l. u. Lungenlappens mit Verkäsung	Allgemeine Anämie					Tub. Bas.-Meningitis fortgesetzt auf der Konnexität. Sulz. Exsud. am Chiasma. Pons bis zum Kleinhirn daselbst u. d. Fossae Sylvii mil. Knötchen

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdauungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
18 45 J.	Spitz-Tub. d. Lungen				Mil.- Tuberkeln		Tub. Bas.-Meningitis. Stärkster Hydroceph. int. Kirschgrosse Tu- berkel im Wurm d. Kleinhirns. Geringe Trüb. am Chiasma; mil. Knötchen längs d. Gefäße
19 27 J.	Adhäs.-Pleuritis. Lupus der Nase						Ak. Tub. Cerebrospinalmenin- gitis mit reichl. sulz. gallertigem Exsudat über d. ganzen Rücken- mark und der Basis d. Gehirns. Hydrocephal. int. Mil.-Tub. in d. Fossae Sylvii
20 73 J.	Käsige Tub. beider Lun- genspitzen mit ak. Caver- nenbildung links	Hyperplasie des r. Herzens u. der Aorta	Tub. Darm- geschwüre				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int. Am Chiasma, Pons u. Hirnschenkel sulz. Exsud. Knötchen spez. ind. Fossae Sylvii
21 28 J.	Pleuritis des r. Unter- lappens. Geheilte Phthise des r. Oberlappens. Peri- bronchitis nodosa						Ak. tub. Meningitis. Erweich. in den Stammteilen und Frontal- lappen der l. Hemisphäre. Fern. Leptomeningitis
22 3 J.	Käsige Bronchialdrüsen. Lobulärpneumonie						Tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephal. int.
23 34 J.	Cavernen im r. Ober- lappen. Chron. Tub. der Lungen		Dickdarm- tuberkulose				Ak. tub. Bas.-Mening. Wenig Exsud. Knötchen längs d. Pial- gefäße
24 20 J.	Kas. Tub. d. peribronch. Drüse. Frische Pleuritis		Tub. Colon- geschwüre				Tub. Bas.-Meningitis (4. Woche)
25 9 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Lobul. Pneumonie rechts unten				Mil.- Tuberkulose	Tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalis int.	
26 32 J.	Spitzen tub. der Lungen		Tub. Ge- schwüre im Dickdarm				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephal. int. Erweichung d. Ven- trikelwandungen

27	Alte adhäs. Pleuritis.						Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalis intern. und extern. Erweiterung säm. Ventrikel!
3 1/4 J.	Tub. Herde im r. Unterlappen						Tub. Bas.-Meningitis
28	Cavernen in beiden Lungen						
39 J.	gesspitzen	Tub. Pericarditis	Tub. Colon-geschwüre	Tub. Peritonitis	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Reichl.
29	Alte käs. Herde i. d. Lungen m. Mil.-Tub. d. Umgeb.				Mil.-Tub.	Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. ser. Exsud. an d. Basis
30	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbild. Alte adhäs. Pleuritis	Hypoplastie d. Herzens u. d. Aorta	Tub. Colon-geschwüre	Käs. Tub. der retroperiton. Drüsen			Tub. Bas.-Meningitis. Kleine Tuberkel im l. Scheitellappen
28 J.							Tub. Bas.-Meningitis
31	Tub. beider Lungen. Adhäs. Pleuritis. Bronchopneumonie r. unten						
19 J.					Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Akute tub. Bas.-Meningitis. Hydroceph. intern. Erweichung d. Wände d. Ventrikel. Hirnödem
32	Mil.-Tub. d. Lunge u. d. Zwerchfells	Mil.-Tub. d. Pericards		Mil.-Tub. d. Peritoneum u. d. Milz			Ausserdem: Tub. Caries u. Perio- stitis der Lendenwirbel, Psoas- abszess
23 J.							
33	Alte adhäs. Pleuritis			Adhäs. Peritonitis		Tub. d. Nieren u. Uretheren beiderseits	Tub. Bas.-Meningitis mit Thrombose d. Art. cerebelli ant. sin. u. art. Fossae Sylvii dextra
42 J.							Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus intern. u. extern
34	Mil.-Tub. d. r. Lunge. Verkäste Bronch.-Drüsen.						
45 J.	Alte adhäs. Pleuritis						Tub. Bas.-Meningitis. Hydroceph. intern. u. ext. höchsten Grades. Solitär-tuberkel des Kleinhirns.
35	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung in beiden Oberlappen		Tub. Darm-geschwüre				
16 J.							
36	Mil.-Tub. d. Lungen u. Pleura	Mil.-Tub. d. Pericards		Mil.-Tub. d. Peritonitis u. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis fortgesetzt auf d. Convexität. Hydroceph. intern. u. ext.
6 J.							Tub. Bas.-Meningitis
37	Tuberk. d. Lungen						
1 1/2 J.							
38	Käsige-eitrige Herde in d. r. Lungenspitze						Tub. Bas.-Meningitis
26 J.							
39	Chron. Tub. d. Lungen m. Cavern.-Bild. i. beid. Oberlappen. Alte adhäs. Pleuritis. Mil.-Tub. i. Zwerchfell					Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus intern. u. ext.
40 J.							

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdauungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
40 20 J.	Käs. Herde im r. Ober- lappen. Käs. Tub. d. peri- bronch. submaxill. Drüsen			Käs. Tub. d. retroperiton. Drüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int. u. ext. Solitär- tuberkel im l. Peritoneallappen
41 31 J.	Chron. Tuberk. beider Lungen mit kl. Cavernen links. Peribronchitis no- dos. Schwartige adhäs. Pleuritis						Ak. Tub. Bas.-Meningitis fort- gesetzt auf der Konnexität. Hy- drocephalus int. höchsten Grades. Hochgradiges Hirnödem
42 18 J.	Subakute und ak. tub. Bronchipneumonie beider Lungen. Lungenödem.						Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int.
43 7 J.	Schul. pneum. Herde beiderseits. Verkäsende Bronch.-Drüsen	Allgemeine Anämie			Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Solitär-tuberkel i. r. Hirnlappen.
44 15 J.	Käs. Tub. sämtl. Drüsen des Brustraums. Subak. Käs. Peribronchitis mit Einschmelzung beid. Lun- genspitzen	Hochgradige Anämie		Käs. Tub. d. peritonealen u. epigastr. Drüsen. Soll- Tub. d. Milz		Soll.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int. Hirnödem
45 36 J.	Spitzeneirrhose in Peri- bronchitis beider Lungen	Endocarditis fibrosa retrahens				Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int.
46 20 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung			Tub. Darm- geschwüre			Tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. u. ext. Hochgrad. Ödem u. Anämie des Gehirns
47 1 1/2 J.	Verkäste Bronchialdrü- sen						Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. u. ext. <i>Neb.-Befund</i> : Caries der Wirbel- säule, Psoasabszess
48 3 1/2 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Verkäste Bronchialdrüsen						Tub. Bas.-Meningitis.

49	Lokale subak. Tub. bei- der Lungenspitzen. Ana- tropie d. Herzens								Tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Hirnödem
61 J.	mie der Lungen								
50	Verk. Bronchialdrüsen. (Cavernen im l. Unterlap- pen. Adhas. Pleuritis								Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int.
4 J.									
51	Chron. Tub. mit Caver- nenbildg. Peribronchitis nodosa								Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. hohen Grades
26 J.									
52	Käs. Tub. der Bronchial- drüsen. Lob - käs. tub. Herd im r. Unterlappen								Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int.
12 J.									
53	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen					Tub. Darm- geschwüre		Tub. Infarkt d. Niere	Tub. Bas.-Meningitis
28 J.									
54	Chron. Tub. d. Lungen. Adhas. Pleuritis beider- seits					Tub. Darm- geschwüre			Tub. Bas.-Meningitis. Neb. Befund: Caries d. letzten Brustwirbels. Psoasabszess
28 J.									Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int.
55	Spitzeneirrhose u. tub. Bronchopneumonie i. bei- den Lungen								
22 J.									
56								Verkäsung d. mesent. Drüsen	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hirn- ödem
3 J.									
57	Chron. Tub. d. Lungen mit akut. Nachschub. Ad- hasive Pleuritis					Ausgedehnte Darm- tuberkulose		Trübe Schwellung d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. u. ext.
49 J.									
58	Chron. Tub. d. Lungen					Tub. Darm- geschwüre			Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. u. ext.
9 J.									Tub. Bas.-Meningitis
59	Tub. käs. Peribronchitis d. l. Lungenspitze								
21 J.									Tub. Bas.-Meningitis
60	Alte adhas. Pleuritis								
70 J.									Tub. Bas.-Meningitis. Hirn- ödem
61	Chron. Tub. d. Lungen. Pleuritisadhasen r.								
32 J.						Atrophie des Herzens			Tub. Bas.-Meningitis.
62	Ak. eirr. Herde beider Spitzen. Adhas. Pleuritis. Subakute Tub. beider Lungen								Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. u. ext. Hirnödem
32 J.						Tub. d. Darms	Verkäsung d. Mesenterial- drüsen		

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulationsorgane	Verdauungskanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harnapparat	Nervensystem
63 4 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Drüsen-Tuberkulose			Mil.-Tub. d. Peritoneums u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext.
64 29 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildg. Tub. des Kehlkopfs. Adhäs. Pleuritis		Ulcer. Darm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis, übergreifend auf d. Konvexität
65 21 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Käs. Bronchialdrüsen			Konglomerat-tuberkel in d. Milz		Konglomerat-tuberkel in d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
66 1 1/2 J.	Käs. Tub. d. Bronchial- und Mediastinaldrüsen			Mil.-Knötchen in d. Milz	Mil.-Knötchen		Tub. Bas.-Meningitis
67 25 J.	Chron. Tub. d. Lungen. Chron.-tub. Bronchitis u. Peribronchitis		Tub. d. Darms				Tub. Bas.-Meningitis. Ein Exsudat nur wenig ausgesprochen
68 36 J.	Chron. Tub. d. Lunge. (or adiposum Cavernen d. L. Lunge						Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
69 4 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Ausgedehnte Drüsen-Tuberkel			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext.
70 24 J.	Hypoplasie des l. Oberlappens						Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext. Xeb.-Befund: Arthritis sub. d. 1. Fussgelenks
71 5 J.	Spitz. Tub. im l. Oberlappen. Adhäs. Pleuritis			Sollitär-Tub. d. Milz	Sollitär-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
72 8 1/2 J.	Verkäste Bronchialdrüsen. Capillar-Bronchitis		Ulcer. Darm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnöd.
73 4 J.	Dissem. Mil.-Tub. der Lungen. Ältere käs. Tub. d. Bronchialdrüsen	Hochgradige Anämie		Mil.-Tub. d. Milz			Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnöd.

74	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung. Adhäsive Pleuritis	Ulcer. Darm-Tub.					Tub. Bas.-Meningitis. Kas. Solitär-Tuberkel d. Ependyms des r. Schhügels. Hydrocephalus int.
39 J.							
75	Mil. Tub. der Lungen.	Beginn. ulcer. Darm-Tub.	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren		Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext.
10 J.	Allgem. Drüsen-Tub.		Ausgedehnte Tub. d. Peritoneums				Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödäm
76	Verkaste Bronchialdrüsen. Capillarbronchitis						
1 3/4 J.							
77	Ältere, teilweise obsolet. Tub. d. Lunge		Ak. u. subak. tub. Peritonit.				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
37 J.		Beginnende ulcer. Darm-Tub.					Subakute tub. Bas.-Meningitis. Akute Leptomeningitis. Hydrocephalus int. Hirnödäm. (rosser Erweichungsherd d. l. Hemisph.
2 1/2 J.							Tub. Bas.-Meningitis
79	Tub. der r. Lunge mit ausgedehnter Cavernenhildung. Tub. Peribronchitis. Tub. der l. Lunge						
27 J.	Myodegeneratio cordis						
80	Mil. Tub. der Lunge		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren		Tub. Bas.-Meningitis
6 J.							
81	Kas. Tub. d. peribronch. Drüsen. Beginnende Tub. der Lungen im l. Oberlappen. Confl. Lobulärpneumonie beiderseits						Tub. Bas.-Meningitis. Pachymeningitis hämorrh. ext.
17 J.							
82	Kas. Tub. d. Bronchialdrüsen		Tub. Peritonitis				Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödäm. Soll.-Tub. am Boden d. 4. Ventrikels
2 1/2 J.						Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
83	Ak. Mil.-Tub. beider Lungen. Adhäs. Pleuritis						Tub. Bas.-Meningitis
20 J.							
84	Chron. Lungen-Tub. mit Cavernenbildung. Ulcer.						
30 J.	Laryngitis						
85	Ak. Mil.-Tub. beider Lungen	Beginnende Darm-Tub.	Mil.-Tub. d. Milz				Tub. Bas.-Meningitis
29 J.							
86	Kas. Tub. der intrathorak. Drüsen. Cavernenbildung in beiden Lungen		Tub. i. Mesenterium. Tub. Periton. Tub. i. d. Milz				Tub. Bas.-Meningitis
3 3/4 J.							

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulationsorgane	Verdauungskanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harnapparate	Nervensystem
87 19 J.	Ak. dissem. Mil.-Tub. d. Lungen, Käs. Tub. d. Bronchialdrüsen	Hochgradige Anämie			Ak. Mil.-Tub.	Ak. Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis, Hydrocephalus int. Hochgradiges Hirn-ödem
88 2 1/2 J.	Tub. d. l. Lunge, Käs. Tub. d. Bronchialdrüsen						Tub. Bas.-Meningitis
89 4 J.	Käs. Tub. d. Lymphdrüsen u. Mediastinus		Tub. d. Darms	Tub. d. mesenter. Drüsen			Tub. Bas.-Meningitis, Hydrocephalus int. Hirn-ödem, Tub. d. Dura mater
90 38 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung		Tub. Darm-geschwüre				Tub. Bas.-Meningitis, Hydrocephalus int. u. ext. Hirn-ödem
91 4 3/4 J.	Tub. der Bronchialdrüsen, Circumskripte Käs. Knoten im r. Unterlappen m. Mil.-Tub. d. Pleura			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
92 1 J.	Tub. d. bronch. Lymphdrüsen, Mil.-Tub. der l. Pleura			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis, Hydrocephalus int. u. ext. Beginnende Tub. d. Dura
93 1 1/2 J.	Käs. Tub. d. Bronchialdrüsen, Capillarbronch.		Tub. Geschw. im Ileum				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Soll. Tub. im Kleinhirn
94 35 J.	Subak. Tub. beider Lungen, Tub. Lymphdrüsen						Tub. Bas.-Meningitis
95 15 J.							Tub. Bas.-Meningitis, Hydrocephalus int.
96 1/2 J.	Mil.-Tub. d. Lungen u. Pleuren, Verkäste Bronchialdrüsen			Mil.-Tub. d. Mesenterialdrüsen	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
97 40 J.	Ältere Spitzen - Tub. l. Dissem. Peribronchitis, Nodosa beiderseits						Tub. Bas.-Meningitis, Starkes Hirn-ödem
98 20 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen, Spitz.-Tub. m. Cav.-Bildg.			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis

99	Dissem. Mil. beider Lungen u. d. Pleuren. Verkäsung der Bronchialdrüsen	Ulc. Darm-Tub.	Mil.-Tub. d. Peritoneums u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext. Hirnödem
4 1/2 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavemenbildung	Ausgedehnte Darm-Tub.			Tub. Pyelonephritis u. Nephritis	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hochgradige Anämie u. Ödem d. Gehirns
23 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Adhäs. Pleuritis	Ulc. Darm-Tub.	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
101	Verkäsung d. Trachea- u. Bronchialdrüsen. Dissem. Mil.-Tub. d. Lungen		Verkäsung d. mesenter. Drüsen	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
5 J.	Chron. tub. Bronchopneumonie mit Cavemenbildung. Adhäs. Pleuritis					Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
102	Dissem. ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Chron. Tub. d. Bronchialdrüsen	Ulc. Darm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis
1 1/4 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
105	Ältere tub. Herde i. beiden Lungenspitzen m. ak. Ausbreitung i. l. Oberlapp.					Ak. tub. Bas.-Meningitis
44 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen					Ak. tub. Bas.-Meningitis
106	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen u. Pleuren. Ältere Spitzentub. beiderseits mit käs. Einschmelzung		Mil.-Tub. d. Peritoneums u. der Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis und sekundäre hämorrhag. Periencephalitis
37 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen. Ausgehollte Tub. beider Lungenspitzen		Käs. Tub. d. mesenter. Drüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis
107	Retr. Tub. beid. Lungenspitzen. Käs. Tub. d. intrathor. Drüsen			Ak. Mil.-Tub. d. Leber		Ak. tub. hämorrhag. Bas.-Meningitis, überreichend auf d. Konvexität d. Hirnlappen. Solitär-Tuberkel beider Occipitalappen
21 J.	Chron. käs. Tub. d. peribronch. Drüsen					Ak. tub. Bas.-Meningitis
108	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen. Ausgehollte Tub. beider Lungenspitzen					Ak. tub. Bas.-Meningitis. Sol-Tub. im 1. Crus cerebri ad pen-tem
21 J.	Retr. Tub. beid. Lungenspitzen. Käs. Tub. d. intrathor. Drüsen					
109	Chron. käs. Tub. d. peribronch. Drüsen					
4 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen. Pneumonie bei der Unterlappen					
110						
4 J.						
111						
26 J.						

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdauungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
112 11 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen u. Pleuren			Ak. Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis mit se- kundärer Erweichung benachbar- ter Hirnteile
113 3 J.	Tub. der peribronchit. Drüsen			Tub. d. retro- perit. u. me- sent. Drüsen. Dissem.-Tub. d. Milz	Dissem.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis
114 1 J.	Tub. d. l. Lungenspitze			Dissem.-Tub. d. mesent. Lymphdrüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis. Aus- gedehnte Mil.-Tub. d. Ependym aller Ventrikel. Hydroceph. int.
115 18 J.	Chron. Tub. d. Oberlap- pen beider Lungen			Käs. Tub. d. retroperiton. Drüsen			Tub. Bas.-Meningitis. Frische Soll.-Tub. im Grosshirn
116 28 J.	Ältere Spitzentuberk. d. Lunge						Tub. Bas.-Meningitis, lokalisiert auf der Unterfläche d. Kleinhirns
117 3 J.	Spitzentub. mit Caver- nenbildung links. Käsige Tub. d. intrathorak. und peribronch. Drüsen		Beginnende Darm-Tub.	Soll.-Tub. in d. Milz	Ak. Mil.-Tub.		Ak. tub. Bas.-Meningitis
118 21 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
119 19 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen	Tub. d. Duct. thoracicus				Käs. Nephrit. Papellaris bei- derseits	Ak. tub. Bas.-Meningitis
120 53 J.	Ältere Spitzentub. d. l. Lunge. Verkäste Bronch.- Drüsen						Ak. tub. und hämorrhag. Bas.- Meningitis. Frische erbsengrosse Soll.-Tub. im Ependym d. l. Sei- tenkammer
121 1/2 J.	Käs. Tub. d. Tracheal- lymphdrüsen. Ältere käs. Herde im r. Oberlappen. Ak. Mil.-Tub. beid. Lungen			Subak. Mil.- Tub. d. Milz			Ak. tub. Bas.-Meningitis und Spinalmeningitis

	Mil.-Tub. d. Lungen u. d. Zwerchfells	Mil.-Tub. d. Pericards	Mil.-Tub. d. Darms	Mil.-Tub. d. Peritoneums u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
122 2 J.	Obsol. Tub. beider Lungen mit subakut. Ausbreitung. Tub. d. Larynx		Subak. Tub. des Dünndarms				Subak. tub. Bas.-Meningitis. Dissem. Ependym.-Tub. aller Ventrikel
123 37 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen u. d. Zwerchfells			Mil.-Tub. d. Peritoneum u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Zwei kleine Solitär-Tuberkel im Kleinhirn
124 1 1/2 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Ältere Tub. beider Oberlappen mit einzelnen käs. Herden		Tub. Geschwür am Wurmfortsatz			Ältere käs. Tub. einer Papille d. l. Niere	Ak. tub. Bas.-Meningitis, fortgesetzt auf d. Konvexität d. r. Hemisphäre. Hydrocephalus int. hämorrhag.
125 29 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung		Ulcer. Darm-Tub.		Mil.-Tub.	Einzelne Mil.-Tub. in d. l. Niere	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Bohrenngrosse käs. Solitär-Tuberkel in d. l. Inselgegend
126 43 J.	Ak. Mil.-Tub. beider Lungen. Ältere käs. Herd d. r. Spitze			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Tub. Herd in d. r. Niere	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Solitär-Tuberkel am vord. Pol d. r. Nucleus caudatus
127 36 J.	Subak. Tub. d. Lunge mit ausgedehnter Peribronchitis nodosa. Tub. adhaes. Pleuritis	Zahlreiche marantische Thromben in beiden Ventri.	Darm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. käs. Tub. d. Dura mater
128 30 J.	Mil.-Tub. der Lunge. Grosse Cavernen im r. Oberlappen. Käs. Pneumonie l. H. U.			Einzelne Knötchen in der Milz	Einzelne Knötchen		Tub. Bas.-Meningitis m. Uebergreifen auf d. Konvexität
129 4 J.	Käsige Pneumonie im r. Unterlappen. Verkäste Bronchialdrüsen			Solitärknötchen in der Milz	Mil.-Knötchen		Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext.
130 1 3/4 J.	Mil.-Tub. der Lungen, eingehend von Tub. d. Ductus thoracicus			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Exsudation minimal. Zahlreiche mil. Knötchen
131 34 J.	Alte Spitzentub. links. Hautnarben d. l. Achselhöhle, herrührend v. Exstirpation d. Axillardrüs.						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödem
132 29 J.	Großp. Pneumonie beider Unterlappen						Tub. Bas.-Meningitis
133 1 1/2 J.							

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdauungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparate	Nervensystem
134 49 J.	Käs. Herd in einer Bronchialdrüse. Chalkosis Anthrakotika (Steinmetz)						Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
135 2 1/2 J.	Chron. Tub. d. r. Lunge mit Cavernenbild. Tub. d. peribronchit. Drüsen. Ak. Dissem.-Tub. d. l. Lunge						Tub. Bas.-Meningitis. Ak. Tub. d. Ventrikeldendymus. Hydrocephalus int.
136 5 J.	Tub. d. r. Unterlapp. m. frischen mil. Nachschüben				Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödém
137 20 J.	Tub. d. Lungenspitzen						Tub. Bas.-Meningitis u. Spinal-Meningitis. Tub. Herd im r. Plex chorioideus later.
138 5 J.	Katarrh. hypost. Pneumonie r. u.; eitrige Bronchitis. Adhäs. Pleuritis l.						Tub. Bas.-Meningitis
139 29 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbild. Tub. serofibr. Pleuritis links		Ulc. Darm-Tub.				Akute tub. Bas.-Meningitis. Hydroceph. int.
140 29 J.	Chron. Tuberk. beider Lungen		Ulc. Darm-Tub.				Ak. tub. Bas.-Meningitis
141 5 J.	Verkäste mediastinale u. bronch. Lymphdrüsen. Mil.-Tub. der Lungen. Käs. Bronchopneumonie R. O.		Ulc. Darm-Tub.	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis, fortgesetzt auf d. Konvexität und d. Dura spinalis
142 15 J.							Caries der Lendenwirbelsäule; aufsteigende, eitr. Pachymeningitis; tub. Bas.-Meningitis speziell über das Kleinhirn. Beiderseits Psoasabszesse; r. m. Durchbruch in d. Inguinalgegend
143 26 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Ältere rechtsseit. Spitzen-Tub. Verk. bronch. Drüsen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.		Tub. Bas. Meningitis

	Subak. Dissem.-Tub. d. Lungen	Ulcer. Darm-Tub.	Tub. d. Nieren.	Ak. tub. Bas. Meningitis
114 30 J.				
145	Ältere lokalis. Tub. d. l. Lunge	Tub. Colon-geschwüre		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödem
146				Tub. Meningitis basalis und cervicalis. Hydroceph. int. Starke Hirndruckscheinungen
66 J.				Ak. tub. Bas.-Meningitis
147	Chron.-Käs. Tub. beider Lungenspitzen und peribronchialen Drüsen. Ak. Bronchopneumonie R. U.			
21 J.				
114	Käs. tub. seros. Pleuritis.		Sparsame Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
64 J.	Käs. Herde d. l. Lungen-spitze			
119	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Käs. Herde d. r. Lungen-spitze			Ak. tub. Bas.-Meningitis
27 J.				
150 48 J.	Spitzen-Tub. r. oben. Käs. Herde l. oben			Ak. tub. Bas.-Meningitis
151	Chron. Tub. d. Lungen			
22 J.	Ulcer. Tub. der Larynx. Käs. Tub. d. intrathor. Drüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis
152 8 J.	Mil.-Tub. der Lungen, ausgehend v. käs. Spitzen-Tub. beiderseits			Ak. tub. Bas.-Meningitis, fortgesetzt auf d. Konvexität
153 4 1/2 J.	Chron. käs. Tub. d. intrathorak. Lymphdrüsen	Circumskript. tub. adhäs. Peritonitis Dissem.-Tub. d. Milz	Dissem.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
151 4 J.	Chron. käs. u. ulceröse Tub. d. Lungen. Tub. d. peribronch. Drüsen	Tub. d. mesenterialen Drüsen		Ak. tub. Bas.-Meningitis
155 40 J.	Subak. und subchron. tub. fibröse Peribronchit. Eine Caverne an der l. Lungenspitze. Adhäsive Pleuritis	Ulcer. Darm-Tub.		Ak. tub. Bas.-Meningitis mit herdförmiger hämorrh. Perencephalitis

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdauungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
156 35 J.	Schieferige Cirrhose beider Lungenspitzen m. eingestreuten kl. käsigen Herden u. beginn. Cavemenbildung. Adhäs. Pleuritis						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hochgradiger Hydroceph. int. Hirn-ödem u. Anämie d. Gehirns
157 17 J.	Herdform. Mil.-Tub. d. Lungen. Käs. erweiterte Herde im r. Mittellappen			Herdförmige Mil.-Tub. d. Milz	Herdf. Mil.-Tub.	Herdf. Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. Hirn-ödem massigen Grades
158 26 J.	Ak. Mil.-Tuberk. beider Lungen. Adhäs. Pleuritis mit Eruption zahlreicher tub. Knötchen. Alte käs. Tub. d. peribronchit. u. exill. Drüsen						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Subakute Soll.-Tub. im r. Kleinhirn des verlängerten Mark und der Rautengrube
159 51 J.	Subak. Tub. d. l. Oberlappens, ältere, schwielig. an d. l. Spitze						Ak. tub. Bas.-Meningitis
160 26 J.	Ak. Mil.-Tuberk. beider Lungen, ausgehend vom käs. Herd d. r. Spitze			Mil.-Tub. d. Milz			Ak. tub. Bas.-Meningitis. Ependymtuberkulose
161 8 J.	Tuberk. Peribronchitis. Käs. Tub. der Bronchialdrüsen						Tub. Bas.-Meningitis. Solitär-Tuberkel im Gross- u. Kleinhirn. Neb.-Befund: Tub. Caries des Kreuzbeins. Psoasabszess
162 15 J.	Käs. Tub. der intrathorak. Drüsen						Ak. tub. Bas.-Meningitis, fortgesetzt auf d. Konvexität. Hydrocephalus int. hohen Grades
163 38 J.	Subak. u. ak. Mil.-Tub. beider Lungen, ausgehend von käs. Herden der r. Spitze		Mil.-Tub. d. Darms	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
164 23 J.	Tub. beider Oberlappen			Tub. d. retroperit. Drüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis, fortgesetzt auf d. Konvexität

165 48 J.	Chronische Tub. beider Lungen							Ak. tub. Bas.-Meningitis. Tub. d. Ependyms u. d. Adergeflechte
166	Mil.-Tub. beider Lungen. Käs. Tub. d. Bronchialdrüsen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren		Ak. tub. Bas.-Meningitis
7 J.					Sparsame Mil.-Tub.	Sparsame Mil.-Tub. d. Nieren		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hochgradiges Hirnödem
167	Subak. u. ak. Mil.-Tub. beider Lungen. Adhas. Pleuritis							
25 J.								
168	Käs. Tub. der Lymphdrüsen. Mil. Ausbreitung in d. Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödem
169								
170	Tub. beider Oberlappen		Tub. d. Coecums					Tub. Bas.-Meningitis
30 J.	Ak. Mil.-Tub. beider Lungen			Mil.-Tub. d. Milz				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Neb.-Befund: Tub. Caries des 5. Halswirbels u. 1. Brustwirbels mit Zusammenbruch des 6. Halswirbels
171	Spitzen-Tub. beiderseits	Cor adiposum						Chron. tuberk. Bas.-Meningitis. Soll.-Tub. in d. Gegend d. r. Fossae Sylvii
53 J.								
172	Chron. indur. u. rector. Tub. beider Lungen	Chron. ulcer. Darm-Tub.		Mil.-Tub. d. Perit. u. d. Milz		Ausscheidungs-Tub. in d. Nieren		Tub. Bas.-Meningitis
39 J.								
173	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen.			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren		Ak. tub. Bas.-Meningitis
56 J.	Tub.-Geschw. im Larynx							
174	Chron. käs. Tub. d. peribronch. Drüsen. Dissem.			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.			Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hirnödem
4 J.	Mil.-Tub. d. Lungen							
175	Chron. Tuberk. d. peribronch. Drüsen. Ak. Mil.-Tub. d. Lungen							Tub. Bas.-Meningitis. Hirnödem
26 J.								
176	Chron. ulcer. Tub. beider Lungen. Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen	Chron. ulcer. Darm-Tub.						Ak. tub. Bas.-Meningitis
49 J.								
177	Tub. d. 1. Bronch.-Drüs., übergreifend a. d. 1. Lunge			Tub. d. Milz				Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
6 J.								
178	Chron. Tub. d. Bronch.-Drüsen u. d. r. Lunge							Tub. Bas.-Meningitis. Dissem. tub. Knötchen d. Dura
1 1/2 J.								

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdaungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
179 27 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Carvenenbild. Mil- Tub. d. Lungen. Tub. La- rynxschwür				Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Soll.-Tub. d. Dura
180 30 J.	Tub. Herd in d. r. Lun- genspitze. Mil.-Tub. der Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
181 3 1/2 J.	Chron. käs. Tub. d. peri- bronch. Drüsen. Käsiges Herd i. r. Oberlapp. Spar- same Mil.-Tub. d. Lungen						Ak. tub. Bas.-Meningitis
182 40 J.	Obsolete Tub. d. Lungen- spitzen					Käs. Pyel- nephritis. Tub. d. Prostata	Tub. Bas.-Meningitis
183 1 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen, ausgehend von käs. Tub. d. peribronch. Drüsen		Mil.-Tub. d. Magens u. Darms, d. mesent. Drüs.	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int.
184 47 J.	Chron.-ulcer. Tub. der Lungen mit subak. Aus- breitung in allen Lungen- teilen		Ulcer. Darm-Tub.				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Tub. d. Ependyms
185 1 J.	Käs. Tub. d. mediast.- und peribronch. Drüsen. Mil.-Tub. d. Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hoch- gradiger Hydroceph. int.
186 36 J.	Chron. Tub. d. r. Lungen- spitze und d. peribronch. Drüsen						Ak. tub. Bas.-Meningitis
187 20 J.	Chron.-käs. Tub. der Intrathorac. Drüsen. Mil.- Tub. beider Lungen	Tub. u. sero-fibrinöse Pericarditis	Tub. Ulcus im Cecum	Dissem. Mil.- Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis, fortgesetzt auf d. Konvexität

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdauungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
201 4 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen						Tub. Bas.-Meningitis
202 17 J.	Frische, herdförmige Verkäsung u. cavernöse Einschmelzung d. rechten Lungenspitze						Ak. tub. Bas.-Meningitis
203 44 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung		Ulcer. Darm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int.
204 37 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung und Cirrhose im l. Oberlappen			Chron. tub. Peritonitis			Beginnende tub. Bas.-Meningitis
205 31 J.	Käs. Tub. beid. Lungen- spitzen. Peribronchitis nodosa		Ulcer. Darm-Tub.				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int.
206 5 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen bei chron. Tub. derselben. Käs. Tub. der Bronchial- drüsen		Mil.-Tub. im Darm	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
207 42 J.	Umschriebene chron. Tub. d. r. Lungenspitze						Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. Hirnödem
208 18 J.	Cav. d. l. Lungenspitze. Anthrakosis. Lob. Pneu- monie in beiden Lungen						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int.
209 1 1/2 J.	Mil.-Tub. der Lungen, ausgehend von käs. Tub. d. Bronchialdrüsen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
210 31 J.	Tub. Verkäsung der Bronchialdrüs. Lobuläre, croupöse-pulmon. Herde in beiden Unterlappen		Ulcer. Darm- Tub. Tub. Ver- käsung d. me- senter-Drüsen				Tub. Bas.-Meningitis
211 11 J.	Subakute Mil.-Tub. der Lungen			Ak. Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Neb.-Befund. Chron. tub. Coxitis.

	Mil.-Tub. der Lungen, ausgehend von käs. Tub. d. peribronch. Drüsen	Beginn. käs. Tub. d. mesen- terial. Drüsen	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningit. cephalus int.
212 3 J.	Mil.-Tub. d. Lungen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis. Hochgr. Hirnödem. Umschrieb. Abzesse im Kleinirn u. Pons
213 13 J.	Mil.-Tub. d. Lungen		Mil.-Tub. d. Netzes u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
214 7 J.	Mil.-Tub. d. Lungen					
215 41 J.	Chron. Tub. d. Lungen mit Cavernenbildung	Tub. Darm- geschwüre				Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int.
216	Käs. Tub. d. Bronchial- drüsen. Tub. Peribronch. Pneumonie d. Unterlapp.				Tub. in der r. Niere	Tub. Bas.-Meningitis
217 35 J.	Obs. indir. Spitz.-Tub. l. Chron. adhäs. Pleuritis					Ak. tub. Bas.-Meningitis
218	Subak. Mil.-Tub. d. Lun- gen. Chron. adhäs. Pleu- ritis l.		Mil.-Tub. d. Periton. u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
219 3 J.	Käs. Tub. d. intrathor. Drüsen. Ak. Mil.-Tub. d. Lungen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int.
220 27 J.	Dissem. Tub. d. Lungen. Tub. d. Zwerchfells	Tub. d. Darm- serose ohne Geschwürs- bildung	Tub. d. Peritoneums, namentl. d. parietal.	Tuberkulose		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int. Hirnödem
221 24 J.	Mil.-Tub. der Lungen, ausgehend von käs. Bron- chialdrüsen		Tub. d. retro- periton. Dru- sen am Ductus thoracicus	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Hirnödem
222 27 J.	Subak. fibrin. und käs. Tub. d. l. Oberlappen					Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hä- morrhag. Hydroceph. int. <i>Neb.-Befund:</i> Multiple, käs.-eitr. Tub. Caries u. Nekrose d. Rippen der Brustwirbelsäule. Präverte- braler Abszess
223 6 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen u. d. l. Lungen- spitze. Mil.-Tub. d. Lungen u. d. Zwerchfells		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tuberk. Bas.-Meningitis. Hirn- ödem

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulationsorgane	Verdauungskanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harnapparat	Nervensystem
224 26 J.	Knotige tub. Bronchopneumonie mit Cavernenbildung			Tub. d. Peritoneum			Tub. Bas.-Meningitis. Solitär-Tuberkel in d. Brücke
225 48 J.	Alte ind. Spitzen-Tub. beiderseits mit frischen Knötchen in allen Lappen. Adhäs. Pleuritis r.						Tub. Bas.-Meningitis
226 23 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen						Ak. tub. Bas.-Meningitis
227 3 1/2 J.	Vereinzelte tub. Knötchen in d. Lunge, Käs. Tub. d. Bronchialdrüsen			Tub. d. Milz			Tub. Bas.-Meningitis
228 35 J.	Mil.-Tub. d. Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis
229 28 J.	Mil.-Tub. d. Lungen				Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis
230 42 J.	Sparsame mil. Knötchen in d. Lungen. Adhäsive Pleuritis			Mil.-Tub. d. Peritoneums		Einzelne mil. Knötchen in d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hochgradiger Hydroceph. int. Hirn-
231 3 1/2 J.	Tub. der r. Lunge mit Cavernenbildung i. ober-lappen. Käs. Peribronch.		Tub. d. Milz		Tuberkulose		Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
232 7 1/2 J.	Chron. Tub. d. Lungen. Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen				Tuberkulose	Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. extern
233 23 J.	Ak. Dissem. Tub., ausgehend von käs. Tub. d. intrathorak. Drüsen	Tub. Endocarditis	Konglomerat-Tub. der Milz. Tub. Periton.			Konglomerat-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
234 5 1/2 J.	Subakute Mil.-Tub. der Lungen		Mil.-Tub. d. Milz		Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis
235 3 1/2 J.	Tub. d. peribronchialen Drüsen						Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. extern. Hirnödem

236 22 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen	Mil.-Tub. d. Milz	Ulcer. Darm-Tub.	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
237	Ak. tub. adhäs. Pleurit. r.; l. mit Obliteration d. Pleurahöhle					Ak. tub. Bas.-Meningitis
32 J.						
238	Chron. Tub. d. r. Oberlappens Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen. Ak. Mil.-Tub. d. Lungen		Subak. Mil.-Tub. d. Darms u. d. mesent. Drüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis
3 3/4 J.						
239	Subchron. fibr. Tuberk. beider Oberlappen	Subak. Tub. Adh. Periton. Sparsame Mil.-Tub. d. Milz	Ulcer. Darm-Tub.	Sparsame Mil.-Tub.		Ak. tub. Bas.-Meningitis
48 J.						
240	Herdform. Tub. d. Lungen. Cavernen d. l. Oberlappens		Kleines tub. Dickdarmgeschwür			Ak. tub. Bas.-Meningitis
31 J.						
241	Ausgedehnte Tub. der Lungen	Ulcer. Darm-Tub.	Einzelne Mil.-Tub. in d. Milz	Mil.-Tub.		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
46 J.						
242	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen	Subak. Tub. d. Darms	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hirn-ödem
1 1/2 J.						Tub. Bas.-Meningitis
243	Mil.-Tub. beid. Lungen. Tub. der bronchialen u. mediastinalen Drüsen mit Erweichung					
7 1/2 J.						
244	Chron. indur. Tub. beider Oberlappen. Chron. Käs. Tub. d. inthorak. Drüsen	Tub. Ulcus ventriculi	Diffuse Tub. peritonitis			Ak. tub. Bas.-Meningitis
30 J.						
245	Chron.-tule. Tub. der l. Lunge mit Ausbreitung in allen Lappen. Adhäsive Pleunitis	Ulcer. Dickdarm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Beginnende Tub. d. Ependyms u. d. Adergeflechte
51 J.						
246	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen bei chron.-ind. Tub. der l. Lunge		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
9 J.						
247	Chron. Tub. beid. Lungen mit Cavernenbildung	Ulcer. Darm-Tub.				Subak. tub. Bas.-Meningitis
22 J.						

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulationsorgane	Verdauungskanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harnapparat	Nervensystem
248 35 J.	Ältere fibr. und ulcer. Tub. d. Oberlappens, besonders R.						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hä-morrhag. Hydroceph. int.
249 46 J.	Chron. ulc. Tub. beider Lungenspitzen mit subak. Ausbreitg. in allen Lappen		Darm-Tub.			Begleit. Ausscheidungs-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
250 26 J.	Submil. Tub. d. Lungen. Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen			Mil.-Tub. d. Peritoneums u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Konglomerat-Tub. im Grosshirn
251 22 J.	Ak. u. subak. Mil.-Tub. beider Lungen		Kleines tub. Geschwür im Dickdarm				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Starkes Hirnödem
252 42 J.	Ak. u. subak. Tub. der Lungen. Cavernen im r. Oberlapp. Adhäs. Pleuritis		Beginnende Darm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis mit Fortsetzung auf d. Konvexität. Solitär-Tuberkel im Kleinhirn
253 30 J.	In beginnender ulcer. befindl. nodöser Tub. beid. Oberlappen						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hochgradiges Hirnödem. Hochgradiger Hydroceph. int.
254 20 J.						Käs.-eitr. Crogenital-Tub., besond. d. l. Niere, d. l. Urethers, d. Harnblase u. d. Prostata	Ak. tub. Bas.-Meningitis
255 27 J.	Subak. u. ak. Dissem. Mil.-Tub. d. Lungen		Tub. d. Ductus thoracicus	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Solitär-Tuberkel im Kleinhirn
256 29 J.	Subak. und subchron. dissem. Tub. beider Oberlappen. Käs. Tub. d. intrathorak. Drüsen			Käs. Tub. d. retroperiton. Drüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. mit Kompression d. Gehirns substanz
257 30 J.	Doppelseitige Spitzen-Tub. mit Cavernen						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Hirnödem

258 9 J.	Chron. ulcer. u. indur. Tub. der Lungen mit Cavernenbildung					Tub. Bas.-Meningitis. (grosse Konglomerat-Tuberkel in der l. Grosshirnhemisphäre)
259 8 J.	Herdförmige chron. Tub. d. Lungen. Käs. Tub. d. Bronchialdrüsen					Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int.
260 42 J.	Indur u. rekur. Tub. d. Lungen, kl. Cavernen an der r. Spitze. Tub. der mediastinalen und peri- bronchialen Drüsen	Tub. d. Ductus thoracicus. Tub. Geschwüre im Dickdarm	Tub. d. Milz	Tuberkulose		Ak. tub. Bas.-Meningitis
261 16 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Verkäste Bronch.-Drüsen	Tub. Geschw. im unteren Ileum	Tub. d. abdomi- nalen Drüs. Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
262 23 J.	Sparsame Mil.-Tub. d. Lungen, ausgehend von käs. Tub. d. peribronch. u. med. Drüsen		Spars. Mil.- Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
263 24 J.	Vereinzelte Tub. in den Lungen	Tub. d. Darm- serosa			Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
264 35 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen Hochgradige ulcer. Tub. d. fungöse tub. d. angrenz. Pericarditis	Adhäs. tub. Peritonitis Mil.-Tub. d. Milz		Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
265 40 J.	Fortschreitende tuberk. Peribronchitis. Chron. ulcer. Tub. alter Lappen- spitzen					Subak. u. ak. tub. Bas.-Menin- gitis, übergreifend auf d. Konve- xität
266 17 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Käs. Tub. d. retrosternal. Drüsen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hoch- gradiger Hydrocephal. int. u. ext. Hochgradiges Hirnödem
267 7 1/2 J.	Käs. Tub. d. intrathorak. Drüsen. Käs. lokalis. Tub. d. l. Oberlappens. Adhäs. tub. Pleuritis		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub.	Ak. tub. Bas.-Meningitis
268 2 J.	Herdförmige Tub. d. r. Oberlappens. Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen					Tub. Bas.-Meningitis

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulationsorgane	Verdauungskanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harnapparat	Nervensystem
269 26 J.	Spitzentub. beiderseits. Ak. Mil.-Tub. d. Lungen		Ulcer. Tub. d. Dickdarms u. d. Process. ferniformis	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
270 20 J.	Doppelseit. Spitzentub. Käs. erweichte Bronch.-Drüsen						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hä-morrh. Hydroceph. int. Hirnod. Subchron. Sol.-Tub. im Klein-hirnnereuen
271 31 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lun-gen. Spitzentub. beider Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro-cephalus int.
272 34 J.	Chron. Tuberk. beider Lungenspitzen. Käs. Pneumonie I.		Beginn. ulcer. Darm-Tub.	Dissem. Tub. d. Milz			Ak. tub. Bas.-Meningitis
273 4 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Käs. Tub. d. mediastin. Drüsen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
274 36 J.	Chron.-ulcer. Tub. d. r. Oberlappens. Dissem. Tub. d. l. Lunge			Dissem. Tub. d. Milz		Dissem. Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Käs. Solitär-Tuberkel d. Kleinhirns
275 63 J.	Chron. käs. Tub. d. peri-bronch. Drüsen mit Erweichung						Ak. tub. Bas.-Meningitis mit Übergreifen auf die Konvexität. Hydroceph. int.
276 2 J.	Chron. -käs. Tub. der bronch. Drüsen. Ak. Mil.-Tub. d. Lungen			Ak. Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.		Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
277 25 J.	Doppelseitige Spitzen-Tub.			Mil.-Tub. d. Peritoneums			Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
278 1 1/2 J.	Chron.-käs. Tub. d. me-diastinal. u. peribronch. Drüsen. Ak. Mil.-Tub. d. Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext. Hirnödem

279	Tub. serofibrin. u. hä-						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro-
24 J.	morrh. Pleuritis. Chron.	Beginnende					cephalus int. Starkes Hirnöd
	u. subak. Tub. d. l. Lunge	Darm-Tub.					
	mit Cavernabildung						
280	Chron. Tub. d. Lungen	Tub. d.					
	mit Cavernabildung. Ul-	mesenter.					Ak. tub. Bas.-Meningitis
24 J.	cer. Tub. d. Larynx	Drüsen					
281	Subak. ind. Tub. beider	Beginnende					
	Spitzen. Ak. Mil.-Tub. d.	Darm-Tub.					Ak. tub. Bas.-Meningitis
25 J.	ob. Lungenlappen. Tub.						
	d. peribronch. Drüsen						
282	Mil.-Tub. d. Lungen	Tub. d. Epik.,	Mil.-Tub. d.	Mil.-Tub.			Ak. tub. Bas.-Meningitis.
1/2 J.		Myocard u.	Milz				Neb.-Befund: Caries des Felsen-
		Endocardis					cranii u. Erweichungsherd im unt.
							Schläfenlappen l.
283	Subak. Mil.-Tuberk. d.		Mil.-Tub. d.	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d.		Tub. Bas.-Meningitis
26 J.	Lungen. Chron. Tub. d.		Milz		Nieren		
	peribronch. Drüsen						
284	Lokalis. herdförm. Tub.						Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce-
	beider Spitzen. Chron.						phalus int. Hirnöd
49 J.	Adhas. Pleuritis						
285	Rekur. Tub. d. Lungen.						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy-
	Kl. Cavernen an beiden						drocephalus int. Hirnöd
23 J.	Spitzen. Adhas. Pleuri-						
	titis rechts						
286	Mil.-Tub. d. Lungen u.		Mil.-Tub. d.	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d.		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro-
2 J.	Pneum. des Zwerchfells.		Milz		Nieren		cephalus int. Gehirnöd
	Tub. d. Bronchialdrüsen						
287	Tub. Bronchitis u. Peri-	Verkäsung d.					Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro-
	bronchitis. Verkäs. d. peri-	mesenter.					cephalus int. u. extern
34 J.	bronchial. Drüsen	Drüsen					
288	Kas. Tub. d. intrathorak.		Dissem. Tub.	Dissem. Tub.	Dissem. Tub.		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy-
	Drüsen. Kas. Pneumonie		d. Milz		d. Nieren		drocephalus int.
1 1/2 J.	l. unten. Dissem. Tuberk.						
	d. Lungen						
289	Chron. ulcer. Tub. der	Tub. d. unt.					Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce-
19 J.	Lungen mit Cav.-Bildung	Dünndarms u.					phalus int. geringen Grades
		Coecums					

Fortl.- Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdaunungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
290 18 J.	Grosse verk. Knoten im l. Oberlappen. Dissem. Mil.-Tub. d. Lungen		Tub. Dün- darm- geschwüre	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int. geringen Grades
291 5 1/2 J.	Chron. Tuberk. beider Lungen mit chron. fibr. adhas. Pleuritis		Darm-Tub.			Chron. Tub. d. Nieren- beckens, d. Ureteren u. d. Blase	Ak. tub. Bas.-Meningitis
292 19 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Käs.-ulcer. Tub. d. peri- bronch. Drüsen				Mil.-Tub.	Sparsame Mil.-Tub. in d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Haselnussgrösse Solitär-Tuberkel im Kleinhirn
293 44 J.	Chron.-indur. u. ulcer. Tub. d. Lungen m. ak. mil. Ausbreitg. Ulcer. Larynx- Tub. der bronch. Drüsen			Käs. Tub. d. intra- abdominalen Drüsen		Subak. Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Hirnödäm
294 50 J.	Ak. tuberk. Pleuritis. Dissem. Tub. d. Lungen. Anthrakosis			Subak. tub. adhäsive Peritonitis			Ak. tub. Bas.-Meningitis
295 19 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen, ausgehend von beginnender Verkäs. beider Lungen- spitzen						Ak. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int.
296 6 J.	Mil.-Tub. d. r. Lungen- spitze um einen älteren Herd herum. Mil. Ein- sprengungen in d. anderen Teilen d. r. Lunge			Mil.-Tub. d. d. Milz	Mil.-Tub.		Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Hirnödäm
297 1 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen. Mil.-Tuberk. der Lungen	Mil.-Tub. d. Epicards		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. Gehirnödäm. Kon- glomerat-Tuberkel im Grosshirn
298 40 J.	Tub. beider Oberlappen		Ulcer. Darm-Tub.				Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. Gehirnödäm

299 12 J.	Chron. Tub. beider Lungen mit (a)verneubildung.	Ulcer. Darm-Tub.				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. Gehirnödem
300	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen bei chron.-käs. Tub. der peribronchialen Drüsen	Älterer tub. Herd im unt. Ileum	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Beginnende Ausscheidungs-Tub. in d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
301 12 J.	Ältere verkäste und verkreidete Tub. d. l. Ober- u. Mittellappens, d. mediastin. Drüsen	Käs. Tub. d. mesenter. Drüsen				Tuberk. Bas.-Meningitis übergreifend auf d. Konvexität, ausgehend von tub. (aries d. Atlas und Epistropheuszahnes
302 37 J.	Subak. Tub. d. Lungen, besonders d. Spitzen		Ak. dissem. Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Ak. dissem. Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis mit hämorrhag.-encephalit. Herden in d. l. Insel, des l. Hinterhauptlappens, im Pons. Hydroceph. int. Hirnödem
303 4 J.	Alte verkäste Tub. d. peribronch. und bifurk. Drüsen. Dissem. Mil.-Tub. d. Lungen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil. Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
304 3 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen, übergreifend auf d. l. Lunge					Ak. tub. Bas.-Meningitis
305 30 J.	Knotige Bronchopneumonie. Adhäs. Pleuritis					Ak. tub. Bas.-Meningitis
306 6 J.	Verkäsung d. mediastin. Drüsen. Eitrige Capillarbronchitis. Mil.-Tub. d. Lungen		Mil.-Tub. d. Peritoneum u. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
307 14 J.	Verkäste tuberk. peribronchiale Drüsen					Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int. u. ext.
308 18 J.	Verkäs. der mediastin. Drüsen. Solitär-Tuberkel in der r. Lunge, kleine (a)vernen im Mittellappen					Ak. tub. Bas.-Meningitis
309 36 J.	Chron. Tub. beid. Oberlappen	Kleine tub. Geschwüre im Ileum	Tub. adhäs. Peritonitis			Tub. Bas.-Meningitis. Hirnödem
310 7 J.	Alte tub. teilweise verkäste Herde in d. peribronch. Drüsen					Ak. Tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulations- organe	Verdaungs- kanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harn- apparat	Nervensystem
311 2 1/2 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Ausgedehnte tub. Verkäs. d. peribronch. Drüsen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
312 3 J.			Tub. d. mesent. Drü- sen mit teil- weiser Verkäs.				Tub. Bas.-Meningitis mit Über- greifen auf d. Konvexität
313 3 J.	Käs. Tub. der Bifurk.- Drüsen, davon ausgehende subak. Mil.-Tub. beider Lungen d. Pleura		Mil.-Tub. des Dünn- u. Dick- darms mit teilweiser Geschwurs- bildung	Mil.-Tub. d. Milz d. mesenter. Drüsen	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. beider Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
314 2 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen						Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int. Gehirnödem
315 43 J.	Rekur. Tub. d. r. Ober- lappens. Adhäs. Pleuritis						Ak. tub.-Bas. Meningitis
316 43 J.	Chron. ulcer. u. rekur. Tub. des l. Oberlappens. Käs. Tub. d. mediastin. Drüsen		Tub. d. Dick- darms				Tub. Bas.-Meningitis
317 31 J.	Mil.-Tub. der Lungen, ausgehend von einem Venentuberkel d. l. Astes d. Ven. pulmonalis. Mil.- Tub. d. Pleuren		Mil.-Tub. d. Dünn- u. Dick- darms	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
318 1 1/2 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen						Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int.
319 14 J.	Käs. Tub. d. peribronch. Drüsen. Peribronchitis. Tub. in allen Lungenab- schnitten		Submiliare Knötchen im Dünndarm				Tub. Bas.-Meningitis. Hydroce- phalus int.

	Verkäs. Tub. d. intra- thor. Drüsen. Mil.-Knöt- chen d. Pleuren		Diffuse Knöt- chen-Tub. d. parietal. u. viscer. Prito- neums. Mil. Knötchen in d. Milz	Mil.- Knötchen	Tub. Bas.-Meningitis. Gehirn- ödem
320 13 J.					
321 26 J.	Recurr. Tub. d. Lungen mit Cavemenbildung	Ulcer. hoch- gradige Darm- Tub.			Ak. tub. Bas.-Meningitis
322 1 3/4 J.	Verkäs. Tub. der peri- bronch. u. Bifurkat. Drüs. Mil. herdform. Tub. der Lungen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int.
323 26 J.	Ak. u. subakt. tub. Pleu- ritis beiderseits. Oblite- ration d. Pleurahöhle				Ak. tub. Bas.- u. Spinalmenin- gitis. Hydrocephalus int. Starkes Hirnödem
324 30 J.	Chron. ulcer. Tub. der Lungen				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydro- cephalus int. Hirnödem u. hoch- gradige Anämie d. Geh.
325 32 J.	Ältere fibröse u. frische ulcer. Tub. d. ob. Lungen- abschnitte				Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hy- drocephalus int.
326 15 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Läng. Chron. verk. Tub. intra- thorak. Drüsen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Ak. tub. Bas.-Meningitis
327 34 J.	Chron. ind. Tub. beider Lungenspitzen mit tub. peribronch. Ausbreitg. r.	Subak. tub. Pericarditis			Ak. tub. Bas.-Meningitis
328 49 J.	Chron. induc. u. ulcer. Tub. beider Lungenspitzen.				Tub. Bas.-Meningitis
329 29 J.	Ak. dissem. Mil.-Tub. d. Lungen. Adhäs. Pleuritis		Chron. käs. Tub. d. retro- periton. Drüs. Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub. Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
330 29 J.	Chron. ulcer. Tub. der Lungen. Chron. käs. Tub. d. mediast. Drüsen. Adh. Pleuritis				Tub. Bas.-Meningitis mit Über- greifen auf d. Konvexität. Hydro- cephalus int. Beginn. Mil.-Tub. d. Adergeflechte

Fortl. Nr. Alter	Respirationsorgane	Zirkulationsorgane	Verdauungskanal	Peritoneum und Milz	Leber	Harnapparat	Nervensystem
331	Chron. käs. Tub. der mediastin. Drüsen u. d. Thymus		Chron. käs. Tub. d. mesenter. Drüsen				Tub. Bas.-Meningitis mit Übergreifen auf d. Konvexität. Hydrocephalus int. hohen Grades. Neb.- <i>Befund</i> : Tub. Caries des Schädeldaches u. d. Proc. spin. d. 4. Brustwirbels
332 5 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Verkäste tub. Bronchialdrüsen		Tub. d. Darms	Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Tub. Bas.-Meningitis
333 12 J.	Mil.-Tub. der Lungen. Ak. tub. Pleuritis l.		Ulcer. Darm-Tub.	Mil.-Tub. d. Milz und Milzkapsel	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis. Hydrocephalus int.
334 4 J.				Tub. d. retroperiton. Drüsen			Ak. tub. Bas.-Meningitis. Gehirnödem
335 24 J.	Alt. tub. Herd der l. Lungenspitze						Tub. Bas.-Meningitis. Frische Ependymtuberkulose
336 23 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Chron. Tub. der Hilusdrüsen. Ältere tub. Peribronchitis im r. Oberlappen					Tub. Infarkte in d. l. Niere	Ak. tub. Bas.-Meningitis
337 4 1/2 J.	Ak. Mil.-Tub. d. Lungen. Käs. Tub. der Bifurkat.-Drüsen		Ältere tub. Geschwüre im Dünn- u. Dickdarm				Tub. Bas.-Meningitis
338 22 J.	Chron. käs. tub. Bronchitis u. Peribronchitis			Tub. Peritonitis			Tub. Bas.-Meningitis
339 1 1/2 J.	Chron. käs. Tub. d. peribronchitis und Bifurkat.-Drüsen. Ak. Mil.-Tub. d. Lungen			Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.	Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis

340 1 J.	Subchron. kas. Tub. d. intrathorak. Drüsen	Uleer. Darm- Tub.	Verkäsung d. interabdomi- nalen Drüsen. Tub. d. Milz	Tuberkulose Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.-Meningitis
341 27 J.	Ak. embol. hämatogene Mil.-Tub. d. Lung. Mul- tiple Tub.-Eruptionen in d. intrathorak. Drüsen		Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub. Mil.-Tub. d. Nieren	Ak. tub. Bas.- u. Spinalmenin- gitis
342 4 J.	Chron. käsige Tub. der peribronch. Drüsen mit Erweichung und Durch- bruch in d. Ösophagus		Verk. d. retro- periton. Drüs. Mil.-Tub. d. Milz	Mil.-Tub.- Eruption	Ak. tub. Bas.-Meningitis

Nach den Ergebnissen dieser Zusammenstellung war die tuberkulöse Basilar­meningitis Teilerscheinung einer allgemeinen Miliartuberkulose 108 mal, d. i. in 31% aller Fälle, wobei zur Miliartuberkulose alle diejenigen Fälle gerechnet wurden, wo neben Gehirn auch Lunge und mindestens ein Organ der Bauchhöhle mit Miliartuberkeln durchsetzt waren.

Es entfielen davon auf das Alter:

Tabelle V.

0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
54 = 50%	15 = 14%	23 = 21%	11 = 10%	3 = 4%	2 = 1%	

In den anderen 66,7% aller Fälle (nach Abzug der auf die scheinbar primären fallenden 2,3%) war neben der tuberkulösen Erkrankung der Hirnhäute die Anwesenheit einer älteren Tuberkulose im Körper nachzuweisen.

Den Weg, den das Gift dabei einschlägt, stellt einmal die Lymphbahn dar, was besonders in den Fällen in Betracht kommen dürfte, wo es sich um eine direkte Infektion von den den Meningen benachbarten tuberkulösen Herden aus handelt, also bei Krankheiten der Schädelknochen¹⁾ und Weichteile: Periostitis und Caries des Schädeldaches, des Felsenbeins und Mittelohrerkrankungen oder tuberkulöse Verschwärung der Nasenschleimhaut (in einem von Demme mitgeteilten Fall). Strümpell²⁾ neigt zu der Ansicht, dass, wenigstens in manchen Fällen, der Infektionsstoff durch die Lymphscheide der Nerven zunächst in den Arachnoidealsack des Rückenmarks gelangt und von hier weiter aufwärts zu der Gehirnbasis.

¹⁾ Iwao Nagai, Ein Fall von tuberkulöser Basilar­meningitis, ausgehend von einer Caries tuberculosa des Atlas und Epistropheus. Dissertation, München 1905. ²⁾ Strümpell, Spez. Pathologie und Therapie, Bd. III.

Ein häufigerer Weg ist wohl jener durch die Blutbahn, zumal wo es sich um weit entfernten Sitz des primären Herdes handelt, von dem aus die Bazillen verschleppt werden. Hierbei können letztere entweder indirekt durch Lymphgefäße, Chylusgefäße in den Ductus thoracicus und von da in das Venenblut gelangen oder direkt in Venen, welche Lymphdrüsen benachbart liegen, eindringen und als kleinste Partikelchen ins Gehirn übersiedeln. Dass dieser Weg der häufigere ist, dafür spricht der Sitz und die Anordnung der miliaren Knötchen längs den arteriellen Gefäßverzweigungen an der Basis des Gehirns.

Betrachten wir nun das in obiger Tabelle niedergelegte Material in Bezug auf die tuberkulösen Herde, die sich neben der tuberkulösen Basilar-*meningitis* fanden, so ergibt sich folgendes:

Es fanden sich unter 342 Fällen von tuberkulöser Basilar-*meningitis* als tuberkulöse Herde:

1. Verkäste Lymphdrüsen allein:

25 mal, d. h. in 8% der Fälle.

Davon entfielen auf die Jahre:

Tabelle VI.

0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
19 = 77%	2 = 8%	3 = 12%				1 = 3%

Wir sehen also, was auch andere Statistiken uns lehren, dass solche Fälle vorwiegend im jugendlichen Alter und zwar besonders im ersten Jahrzehnt vorkommen.

Die Verkäsung betraf in erster Linie die peribronchialen, bronchialen und mediastinalen Lymphdrüsen, in zweiter die genannten gleichzeitig mit den abdominalen; letztere allein waren nur in zwei Fällen verkäst.

2. Tuberkulöse Erkrankung der Lungen oder Bronchien allein:

60mal, d. h. in 18% der Fälle.

Davon entfielen auf die Jahre:

Tabelle VII.

0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
	6 = 10%	24 = 40%	17 = 28%	11 = 18%	2 = 4%	

An diesen Fällen ist also das erste Jahrzehnt gar nicht, vorwiegend dagegen das dritte und dann das vierte beteiligt.

3. Tuberkulose eines Organsystems allein ohne Lungen- oder Drüsentuberkulose:

einmal, d. h. in 0,3% der Fälle.

In diesem einen Fall — er betraf einen 21jährigen Mann — fand sich käsige-eitrige Urogenitaltuberkulose, besonders der linken Niere, des linken Urethers, der Harnblase, des rechten Nebenhodens und der Prostata.

Da somit in den dreierlei bis jetzt angeführten Arten von tuberkulösen Herden — verkäste Lymphdrüsen allein, tuberkulöse Lungenerkrankung allein, Tuberkulose eines Organsystems allein ohne gleichzeitige tuberkulöse Lungen- oder Drüsenerkrankung — neben der tuberkulösen Hirnhautaffektion sonst keine Tuberkulose im Körper vorhanden war, ist wohl der Schluss gerechtfertigt, dass in den ersten Fällen nur die tuberkulös erkrankten Lymphdrüsen, in den zweiten die tuberkulöse Affektion der Lunge, im dritten die Urogenitaltuberkulose den Ausgangspunkt der tuberkulösen Basilar-meningitis darstellen.

Unsicher dagegen erscheint es, einen Schluss betreffs des

Ausgangspunktes der tuberkulösen Leptomeningitis der Basis in denjenigen Fällen zu ziehen, in welchen sich tuberkulöse Erkrankungen in mehreren Organen des Körpers gleichzeitig vorfinden.

Über die hierher gehörigen Fälle gebe ich im folgenden eine Übersicht. Es fanden sich

4. Tuberkulose der Lungen und verkäste Lymphdrüsen:

41 mal, d. h. in 12% der Fälle.

Davon entfielen auf die Jahre:

Tabelle VIII.

0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
24 = 60%	9 = 22%	5 = 12%		2 = 4%		1 = 2%

Weitaus das grösste Kontingent zu diesen Fällen stellt wieder wie in Rubrik 1 das erste Jahrzehnt, in zweiter Linie kommt hier das zweite Jahrzehnt, während die übrigen weniger beteiligt sind.

Ferner betraf auch hier — neben der gleichzeitigen Lungenerkrankung — die Verkäsung vorwiegend die bronchialen bzw. peribronchialen, in zweiter Linie diese zusammen mit den mesenterialen Lymphdrüsen.

5. Tuberkulose der Lunge und Tuberkulose anderer Organe der Bauchhöhle:

79 mal, d. h. in 25,7% der Fälle.

Dasjenige Organ, welches neben der Lunge allein von Tuberkulose ergriffen war, ist in erster Linie der Darm in Form von ulcerierender Darmtuberkulose.

Unter den 79 Fällen kam dies 44 mal vor, d. h. in 64%.

Von diesen entfielen auf das Alter:

Tabelle IX.

0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
5 = 11%	4 = 9%	17 = 40%	9 = 20%	8 = 17%	1 = 1%	

Unter den restierenden 35 Fällen = 36% dieser Rubrik finden sich — neben Lungentuberkulose —

Solitärtuberkel in Leber, Milz oder Nieren	27 mal,
Tuberkulose des Urogenitalapparates	3 „
tuberkulöse Peritonitis	3 „
tuberkulöse Peritonitis und käsige Tuberkulose der Nebennieren	1 „
tuberkulöse Pericarditis	1 „

6. Tuberkulose der Lungen und tuberkulöse Knochenherde:

neunmal, d. h. in 3% der Fälle.

Davon entfielen auf das Alter:

Tabelle X.

0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
3 = 33%	2 = 22%	4 = 45%				

Unter den tuberkulösen Knochenherden fanden sich:

Herde der Schädelknochen	3 mal,
„ „ Hals- und Brustwirbelsäule	4 „
„ „ Lendenwirbelsäule,	
„ „ Becken- und Oberschenkelknochen	2 „
(beide mit Psoasabszessen).	

Der Übersichtlichkeit halber will ich alles das, was sich aus der statistischen Zusammenstellung bis jetzt ergeben hat, in einer einzigen Tabelle zusammenfassen.

Es fand sich die tuberkulöse Basilar meningitis:

Tabelle XI.

		Davon entfallen auf das Alter						
		0—10	11—20	21—30	31—40	41—50	51—60	61—70
Neben Miliartuberkulose in	31 %	50 %	14 %	21 %	10 %	4 %	1 %	
Neben Tuberkulose der Lungen und Tuberkulose eines oder mehrerer Organe der Bauchhöhle	25,7 %	18 %	8 %	35 %	23 %	14 %	1 %	1 %
Neben Tuberkulose der Lungen allein	18 %		10 %	40 %	28 %	18 %	4 %	
Neben Tuberkulose der Lungen und verkästen Lymphdrüsen	12 %	60 %	22 %	12 %		4 %		2 %
Neben verkästen Lymphdrüsen allein	8 %	77 %	8 %	12 %				3 %
Neben Tuberkulose der Lungen und tuberkulösen Knochenherden	3 %	33 %	22 %	45 %				
Scheinbar primär	2,3 %	25 %	12,5 %	25 %	12,5 %	12,5 %		12,5 %

Es ist aus dieser Tabelle die Art und Häufigkeit tuberkulöser Herde, wie sie sich bei tuberkulöser Basilar-*meningitis* im Körper finden können, so klar ersichtlich, dass ich glaube, weitere Ausführungen darüber unterlassen zu können.

Dagegen möchte ich noch kurz auf den pathologisch-anatomischen Gehirnbefund bei tuberkulöser Basilar-*meningitis* eingehen.

Nach Abnahme der stark gespannten, blutreichen Dura mater zeigt die Hirnoberfläche meist eine ziemliche Abplattung und Verstreichung der Sulci. Die wesentlichsten Veränderungen betreffen die Basis des Gehirns. Hier findet sich ein weissgelbliches oder gelbgrünliches Exsudat zwischen Pia und Arachnoidea, das am massenhaftesten ist zwischen Chiasma opticum und Pons. In allen den von mir zusammengestellten Fällen war es in dieser Gegend stets vorhanden, wenn auch einige Male nur in geringem Grade.

Längs der Arter. und Ven. fossae Sylvii zeigen sich miliare Knötchen, welche bis in die kleineren Arterienzweige sich fortsetzen, sie umfassen und verengern.

Seltener ist auch gleichzeitig die Konvexität des Gehirns mitergriffen. Die weichen Häute sind hier im allgemeinen durchsichtig oder nur leicht getrübt und die venösen Gefässe gleich jenen der Hirnoberfläche mit Blut überfüllt.

Ein Übergreifen des Prozesses auf die Konvexität fand ich 19 mal, d. i. in 6% der Fälle.

Eine tuberkulöse Erkrankung der Dura fand ich nur viermal, d. h. in 1,2%.

Eine häufige Begleiterscheinung der tuberkulösen Basilar-*meningitis* ist die Erweiterung der Hirnventrikel mit gleichzeitigem Erguss in dieselben, der Hydrocephalus internus. Doch ist derselbe kein ständiger Begleiter der tuberkulösen Hirnhautentzündung. Dieser Erguss, der ein entzündliches Exsudat aus den Gefässen des Ventrikelplexus darstellt, wird

nach den Angaben von Huguenin¹⁾ in 18%, nach Seitz²⁾ in 25% der Fälle vermisst; nach meiner Zusammenstellung ist dies öfter der Fall. Unter den 342 Fällen war Hydrocephalus internus vorhanden 134mal, d. h. in 40% der Fälle; unter diesen 134 Fällen war 17 mal gleichzeitig Hydrocephalus externus vorhanden. Die Ergüsse waren rein serös oder zellig getrübt, nur dreimal hämorrhagisch. Weingärtner³⁾ fand in seiner Statistik Hydrocephalus internus in 50% der Fälle.

Eine Fortsetzung der Exsudation auf die Häute des Rückenmarks fand ich viermal.

Bei diesen Erscheinungen an den Meningen kann es nicht ausbleiben, dass das Gehirn ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wird. So findet man häufig ein allgemeines oder partielles Ödem des Gehirns. Ich fand es unter 342 Fällen 67mal verzeichnet, d. h. in 20% der Fälle.

Eine gleichzeitige miliare Tuberkulose des Ependyms der Ventrikel fand ich in 10 Fällen.

Ophüls⁴⁾ wies zuerst darauf hin, dass dieser Befund der früher als sehr selten angesehen wurde, bei tuberkulöser Basilarmeningitis ziemlich häufig vorkomme; er konnte zuerst in neun Fällen tuberkulöser Meningitis feine, graue Knötchen im Ependym nachweisen, deren mikroskopische Untersuchung ergab, dass es sich um tuberkulöse Veränderungen handelte. Dass immerhin das Vorkommen derselben nicht häufiger im pathologisch-anatomischen Gehirnbefund erwähnt ist, hat vielleicht darin seinen Grund, dass, bevor der bazillenhaltige Infektionsstoff Zeit gefunden hat, in diesen entfernten

¹⁾ Ziemssens Handbuch der speziellen Pathologie u. Therapie, Bd. XI.

²⁾ Seitz, Die Meningitis Tuberkulosa 1874.

³⁾ Weingärtner, Dissert. Kiel 1901.

⁴⁾ Ophüls, Über die Ependymveränderungen bei tuberkul. Meningitis. Virchows Archiv 150.

Gegenden zu makroskopisch sichtbarer Tuberkeleruption zu führen, die Erkrankung der so empfindlichen Hirnhäute bereits zum Tode geführt hat.

Endlich finden wir relativ häufig das Vorhandensein von käsigen Solitärtuberkeln im Gehirn. Es ist als wahrscheinlich anzunehmen, dass in dem einen oder anderen Falle diese in der Schädelhöhle selbst gelegenen tuberkulösen Herde durch direkte Infektion auf dem Wege der Lymphbahn den Ausgangspunkt für die sekundäre Erkrankung der Hirnhäute gebildet haben.

Ich finde unter den 342 Fällen in den Protokollen beim pathologisch-anatomischen Gehirnbefund käsige Solitärtuberkel 22 mal verzeichnet, d. h. in 6,5% der Fälle. Und zwar fanden sich käsige Solitärtuberkel im Kleinhirn zehnmal, im Gross- und Kleinhirn zweimal, am Pons zweimal, im Parietal-, Stirn-, Schläfen-, Occipitallappen, am Boden der Rautengrube, am Boden des Nucleus caudatus, in der linken Fossa Sylvii und der Inselgegend je einmal.

Zum Schlusse sei es mir gestattet, Herrn Professor Dr. Hermann Dürck für die Überlassung dieser Arbeit und Anregung zu derselben, sowie Herrn Obermedizinalrat Professor Dr. von Bollinger für die Übernahme des Referates bestens zu danken.

Litteratur.

Lubarsch-Ostertag: Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie.

O. Pertik: Pathologie der Tuberkulose.

Dürck-Oberndorfer: Referate über den heutigen Stand der Tuberkuloseforschung.

Eulenburg: Realencyklopädie der gesamten Heilkunde. Bd. VIII.

Ziemssen: Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie. Bd. XI.

Strümpell: Spezielle Pathologie und Therapie. Bd. III.

Lebenslauf.

Ich bin geboren am 15. Februar 1875 zu Augsburg als Sohn des verstorbenen Kaufmanns Leo Ilzhöfer, besuchte daselbst die Volksschule und das humanistische Gymnasium, das ich Sommer 1894 absolvierte; dann diente ich das einjährig-freiwillige Jahr und bezog Winter 1895 die Universität München; an dieser sowie an den Universitäten Berlin und Tübingen studierte ich Chemie und promovierte im Winter 1901 an letzterer Universität zum Doktor der Naturwissenschaften. Nachdem ich dann während des Restes dieses Semesters und des nächsten Semesters an der Universität München chemischen und botanischen Studien obgelegen, begann ich im Winter 1902 an derselben Universität das medizinische Studium, das ich in der ersten Hälfte des Wintersemesters 1906 durch Bestehen der Approbationsprüfung beendete.

Hermann Ilzhöfer.

